

مسئله‌ای احتمالاتی در زیر گروه‌های فازی متمايز یک گروه

حسین نراقی، علی ایرانمنش

بخش ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ دریافت: ۱۳۸۶/۱۰/۵ تاریخ آخرین بازنگری: ۱۳۸۶/۸/۱۰

چکیده: در این مقاله، ابتدا تعریف جایجا شدن دو زیرگروه فازی یک گروه بیان شده، سپس احتمال جایجا شدن دو زیر گروه فازی متمايز گروه Z_{p^n} که تکیه گاهشان دقیقاً Z_{p^m} است به دست آورده شده است.

واژه‌های کلیدی: زیرمجموعه فازی، زیرگروه فازی، پرچم.

۱ مقدمه

پس از آنکه نظریه مجموعه‌های فازی توسط زاده (۱۹۶۵) مطرح شد، رزنفلد (۱۹۷۱) مقاله خود را در نظریه زیر گروه‌های فازی نوشت، که سرفصلی جدید در ریاضیات فازی از جمله گروه‌های فازی گشود. در گروهها یکی از مباحث مورد تحقیق، احتمال جایجا شدن دو عضو از یک گروه است و مقالات متعددی در این زمینه به چاپ رسیده است که از جمله آنها گاستافسون (۱۹۷۳) و شرمن (۱۹۷۵) می باشند، حال، این سوال مطرح است که آیا می توان این مباحث را در گروه‌های

آدرس الکترونیک مسئول مقاله: علی ایرانمنش، iranmane@modares.ac.ir
کد موضوع بنای ریاضی (۲۰۰۰): ۶۲F86، ۶۰B15

۱۱۶ مسئله‌ای احتمالاتی در زیر گروههای فازی متمایز یک گروه

فازی نیز مطرح کرد؟ در واقع احتمال جابجا شدن دو زیر گروه فازی متمایز یک گروه متناهی که تکیه گاه آنها دقیقاً یکسان است چقدر است؟ این پرسشی است که میتواند بطور طبیعی به ذهن برسد. یکی از گروههای مهم Z_{p^n} است که از دیدگاههای مختلفی روی این گروه بحث شده است و مقالات مختلفی چه در زمینه فازی و چه در سایر زمینه‌ها به چاپ رسیده است به عنوان نمونه می‌توان به مقالات مورالی و ماکامبا در سالهای (۲۰۰۱) و (۲۰۰۴) اشاره نمود. مقاله حاضر به محاسبه احتمال جابجا شدن دو زیر گروه فازی از گروههای دوری بصورت Z_{p^n} که تکیه گاه آن دقیقاً Z_{p^m} است، اختصاص دارد.

۲ پیش نیازها

هر نگاشت از X به فاصله [۰, ۱] را زیر مجموعه فازی از X نامند، وقتی μ یک زیر مجموعه فازی از X باشد به $\text{supp } \mu = \{x \in X | \mu(x) > 0\}$ تکیه گاه μ و به ازای هر $t \in [0, 1]$ $\mu_t = \{x \in X | \mu(x) \geq t\}$ را زیر مجموعه تراز μ نسبت به t می‌نامند و خانواده $\{\mu_t | t \in \text{Im } \mu\}$ را با F_μ نمایش می‌دهند.

تعریف ۱ : فرض کنید G یک گروه و زیر مجموعه فازی μ از G به قسمی باشد که:

$$\text{الف) } \mu(xy) \geq \min\{\mu(x), \mu(y)\}, \quad x, y \in G$$

$$\text{ب) } \mu(x^{-1}) \geq \mu(x), \quad x \in G$$

ج) اگر e عضو خنثی گروه G باشد، آنگاه $\mu(e) = 1$

در اینصورت μ یک زیر گروه فازی از G نامیده می‌شود. مجموعه تمام زیر گروههای فازی از G نیز با $F(G)$ نمایش داده می‌شود.

تعریف ۲ : (مورالی و ماکامبا، ۲۰۰۴) یک پرچم برای گروه G ، یک زنجیر متناهی اکیداً صعودی از زیر گروه‌های $G_0 = (e) \subset G_1 \subset \dots \subset G_n = G$ مانند است، به طوری که به ازای هر i $1 \leq i \leq n$ یک زیر گروه ماکزیمال G_i باشد. هر G_i پرچم یک مولفه و n طول این پرچم نامیده می‌شود.

تعریف ۳ : دو زیر گروه فازی ν و μ از گروه G هم ارز نامیده می‌شوند، هرگاه تکیه گاه آنها یکسان و $F_\mu = F_\nu$ باشد. هم ارزی دو زیر گروه فازی بصورت $\nu \sim \mu$

و رده هم ارزی μ با $[\mu]$ نمایش می شود.

در این مقاله منظور از مجموعه تمام زیرگروههای فازی متمايز گروه G ، یک خانواده انتخاب شده از زیرگروههای فازی غیر همارز از G است، که عدد اصلی آن برابر تعداد کلاسهای همارزی روی $F(G)$ می باشد. این خانواده بعد از انتخاب با $F_t(G)$ و عدد اصلی آن با t_G نمایش داده می شود. با توجه به اینکه هر گروه متناهی دارای یک سری ترکیبی است و هر سری ترکیبی در گروه آبلی یک پرچم می باشد بنابراین هر گروه آبلی متناهی نیز دارای یک پرچم است.

قضیه ۱ : (سیکلسون، ۲۰۰۶) اگر G یک گروه آبلی از مرتبه $p_1^{n_1} \times \cdots \times p_r^{n_r}$ باشد، که در آن p_i ها اعداد اول و متمايزند، آنگاه طول هر پرچم G برابر با $n_1 + \cdots + n_r$ است.

قضیه ۲ : (ماشینچی و زاهدی، ۱۳۶۸) اگر $\varphi : G_0 = (e) \subset G_1 \subset \cdots \subset G_n = G$ یک پرچم از G باشد و $\lambda_i \in [0, 1], 1 \leq i \leq n$ و به ازای هر $1 \geq \lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n$ در اینصورت μ یک زیر گروه فازی از G است، که در آن:

$$\mu(x) = \begin{cases} 1 & x \in G_0 \\ \lambda_1 & x \in G_1 - G_0 \\ \vdots & \vdots \\ \lambda_n & x \in G_n - G_{n-1} \end{cases}$$

زیر گروه فازی تعریف شده در قضیه ۲ با $\varphi(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ نمایش داده می شود.

قضیه ۳ : فرض کنید μ یک زیر گروه فازی از گروه متناهی G و $Im(\mu) = \{1, \alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ باشد، بطوریکه $\alpha_1 > \cdots > \alpha_r > 1$ ، آنگاه اعدادی طبیعی مانند $n_i \leq r$ با شرط $\sum_{i=0}^r n_i = n$ و پرچمی مانند φ وجود دارد بطوریکه:

$$\mu = (\underbrace{1 \cdots 1}_{n'_0} \underbrace{\alpha_1 \cdots \alpha_1}_{n'_1} \cdots \underbrace{\alpha_r \cdots \alpha_r}_{n'_r}) \varphi$$

$$\begin{aligned}\varphi : (G_0) &\subset G_1 \subset \cdots \subset G_{n_0} \\ &\subset G_{n_0+1} \subset \cdots \subset G_{n_1} \\ &\vdots \\ &\subset G_{n_{r-1}+1} \subset \cdots \subset G_{n_r}\end{aligned}$$

که در آن $n'_i = n_i - (n_1 + \cdots + n_{i-1})$ و $n'_0 = n_0$

برهان : اگر $\mu_1 \subset \mu_{\alpha_1} \subset \cdots \subset \mu_{\alpha_r} = G$ باشد، واضح است که $\varphi_\mu : (e) \subset G_1 \subset \cdots \subset G_{n_0} = \mu_1$ در غیر اینصورت با درج زیر گروه‌های مناسب به این زنجیر اکیداً صعودی میتوان آن را به یک پرچم روی G مانند

$$\begin{aligned}\varphi_\mu : (e) &\subset G_1 \subset \cdots \subset G_{n_0} = \mu_1 \\ &\subset G_{n_0+1} \subset \cdots \subset G_{n_1} = \mu_{\alpha_1} \\ &\vdots \\ &\subset G_{n_{r-1}+1} \subset \cdots \subset G_{n_r} = G\end{aligned}$$

توسعه داد. برای اثبات قضیه در این حالت کافی است قرار دهیم

$$\mu = (\underbrace{1 \cdots 1}_{n'_0} \underbrace{\alpha_1 \cdots \alpha_1}_{n'_1} \cdots \underbrace{\alpha_r \cdots \alpha_r}_{n'_r}) \varphi_\mu$$

۳ احتمالات در زیر گروه‌های فازی متمایز یک گروه

تعريف ۴ : فرض کنید ν و μ دو زیر گروه فازی از G باشند، زیرمجموعه فازی $\mu \circ \nu$ از G را چنین تعریف می‌کنیم.

$$\mu \circ \nu : G \rightarrow [0, 1]$$

$$\mu \circ \nu(x) = \sup \{ \min \{ \mu(y), \nu(z) \} \mid y, z \in G, yz = x \}$$

گوییم ν و μ با هم جابجا می‌شوند اگر و تنها اگر $\mu \circ \nu = \nu \circ \mu$.

با فرض آنکه G یک گروه متناهی و H زیرگروه G باشد. مجموعه تمام زیرگروه‌های فازی متمایز G که تکیه‌گاهشان دقیقاً H است را با $F_{t_H}(G)$ نمایش داده و قرار می‌دهیم

$$c_{t_H} = \{(\mu, \nu) \in F_{t_H}(G) \times F_{t_H}(G) \mid \mu \circ \nu = \nu \circ \mu\}$$

در این صورت احتمال جابجا شدن دو عضو از زیرگروه‌های فازی متمایز گروه G ، که تکیه‌گاه آنها دقیقاً H است، عبارتست از:

$$P(c_{t_H}) = \frac{|c_{t_H}|}{|F_t(G) \times F_t(G)|} = \frac{|c_{t_H}|}{(t_G)^2}.$$

قضیه ۴: (مردسن و مالیک، ۱۹۹۵) فرض کنید G یک گروه آبلی و μ, ν دو زیرگروه فازی از G باشند در این صورت $\mu \circ \nu = \nu \circ \mu$

قضیه ۵: فرض کنید G یک گروه متناهی باشد در اینصورت تعداد زیرگروه‌های فازی متمایز گروه G که تکیه‌گاهشان دقیقاً G است برابر $\frac{t_G+1}{3}$ می‌باشد.
برهان: زیرگروه فازی $[0, 1] \rightarrow G$: μ^* را چنین تعریف می‌کنیم:

$$\forall x \in G, \mu^*(x) = 1$$

و قرار می‌دهیم:

$$\begin{aligned} U(G) &= \{[\mu] \mid \mu \neq \mu^*, \mu \in F(G), \text{supp } \mu = G\} \\ V(G) &= \{[\mu] \mid \mu \in F(G), \text{supp } \mu \subset G\} \end{aligned}$$

بنا به قضیه ۳، چون G متناهی است می‌توان μ را بصورت

$$\mu = (\underbrace{1 \cdots 1}_{n'_0} \underbrace{\lambda_1 \cdots \lambda_1}_{n'_1} \cdots \underbrace{\lambda_r \cdots \lambda_r}_{n'_r})\varphi$$

۱۲۰ مسئله‌ای احتمالاتی در زیر گروه‌های فازی متمایز یک گروه

در نظر گرفت، که در آن $\{\lambda_1 > \dots > \lambda_r > 0\}$ و $Im\mu = \{1, \lambda_1, \dots, \lambda_r\}$

$$\begin{aligned}\varphi : G_0 &= \{e\} \subset G_1 \subset \dots \subset G_{n_0} = \mu_1 \\ &\subset G_{n_0+1} \subset \dots \subset G_{n_1} = \mu_{\lambda_1} \\ &\vdots \\ &\subset G_{n_{r-1}+1} \subset \dots \subset G_{n_r} = \mu_{\lambda_r}\end{aligned}$$

و به ازای هر i اعداد طبیعی n_i هستند بطوریکه $n_0 + \dots + n_r = n$ و $n'_i = n_i - (n_1 + \dots + n_{i-1})$ و $n'_0 = n_0$ را با ضابطه

$$f([\mu]) = [(\underbrace{1 \cdots 1}_{n'_0} \underbrace{\lambda_1 \cdots \lambda_1}_{n'_1} \cdots \underbrace{\lambda_{r-1} \cdots \lambda_{r-1}}_{n'_{r-1}} \circ \cdots \circ) \varphi]$$

تعریف می‌کنیم. برای اثبات خوش تعریفی، اگر $[\nu] = [\mu]$ باشد قرار می‌دهیم $F_\eta = F_{\lambda_\mu} = F_\mu - \{G\}$. اگر $f[\nu] = [\lambda_\nu]$ باشد آنگاه $f[\mu] = [\lambda_\mu]$ از طرفی F_μ, F_ν همچنین با توجه به اینکه اعضای F_μ, F_ν پس $F_\eta = F_\nu - \{G\} = F_{\lambda_\nu}$ داریم $\text{supp } \eta = \text{supp } \lambda_\nu$ پس $\eta \sim \lambda_\nu$ لذا $\eta \in f[\nu]$ پس $f[\nu] \subseteq f[\mu]$ و بطریق مشابه $f[\nu] \subseteq f[\mu]$ در نتیجه $f[\nu] = f[\mu]$. یک زنجیر اکیداً صعودی هستند داریم $\text{supp } \eta = \text{supp } \lambda_\nu \sim \lambda_\nu$ پس $\eta \sim \lambda_\nu$ به این بودن f نیز بطریق مشابه ثابت می‌شود، پوشاندن نیز با توجه به ضابطه f واضح است. لذا $|U(G)| = |V(G)|$ اما

$$t_G = |U(G)| + |V(G)| + 1$$

پس داریم

$$t_G = 2|U(G)| + 1 \Rightarrow |U(G)| = \frac{t_G - 1}{2} \Rightarrow |U(G)| + 1 = \frac{t(G) + 1}{2}$$

بنابراین تعداد زیر گروه‌های فازی متمایز G که تکیه‌گاه آنها دقیقاً برابر با G است برابر با $\frac{t_G + 1}{2}$ می‌باشد.

قضیه ۶: به ازای هر $n \in N$ تعداد زیر گروه‌های فازی متمایز گروه Z_{p^n} که تکیه‌گاه آن دقیقاً Z_{p^n} است برابر با 2^n می‌باشد.

برهان : قرار می‌دهیم $G = Z_{p^n}$. مجموعه‌های $S(G) = \{H \mid H \leq G, H \neq G\}$ ، $\{[\mu] \mid \mu \neq \mu^*, \mu \in F(G), \text{supp } \mu = G\}$ و $f : U(G) \rightarrow FS(G)$ را تعریف می‌کنیم. همچنین تابع $FS(G) = \{A \mid A \subseteq S(G)\}$ را با ضابطه

$$f([\mu]) = \{\mu_1, \mu_{\lambda_1}, \dots, \mu_{\lambda_{r-1}}\}$$

تعریف می‌کنیم، که در آن $Im(\mu) = \{1, \lambda_1, \dots, \lambda_r\}$ با شرط $\lambda_1 > \dots > \lambda_{r-1} > 1$. ابتدا نشان می‌دهیم f یک به یک است. فرض کنیم $f([v]) = f([w])$ و $\mu, v \in F(G)$. بنابراین اگر $Im(v) = \{1, \beta_1, \dots, \beta_r\}$ و $Im(\mu) = \{1, \alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ آنگاه $1 > \beta_1 > \dots > \beta_s$ و $\{1, \alpha_1, \dots, \alpha_r\} = \{\mu_1, \mu_{\alpha_1}, \dots, \mu_{\alpha_{r-1}}\} = \{\mu_1, \mu_{\beta_1}, \dots, \mu_{\beta_{s-1}}\}$ لذا $\mu_1 \subset \mu_{\beta_1} \subset \dots \subset \mu_{\beta_s} = G$ و $\mu_1 \subset \mu_{\alpha_1} \subset \dots \subset \mu_{\alpha_r} = G$ از این‌جا $\text{supp } \mu = \text{supp } v$ و $F_\mu = F_v$. بنابراین $\mu_{\alpha_i} = v_{\beta_i}$ $1 \leq i \leq r$ باشد. بنابراین $[\mu] = [v]$.

پوششی بودن f نیز واضح است. چون $|S(G)| = |FS(G)| = 2^n - 1$ و $|F(G)| = 2^n - 1 + 1 = 2^n$ آنها دقیقاً برابر باشند.

قضیه ۷ : به ازای هر $n \in N$ تعداد زیرگروههای فازی متمایز گروه Z_{p^n} برابر با $2^{n+1} - 1$ می‌باشد.

برهان : قرار می‌دهیم $G = Z_{p^n}$. بنابر قضیه قبل تعداد زیرگروههای فازی متمایز Z_{p^n} که تکیه‌گاه آن دقیقاً Z_{p^n} است برابر 2^n می‌باشد. از طرفی بنابر قضیه ۵ این عدد برابر $\frac{t_G+1}{2}$ می‌باشد، بنابراین $1 - 2^n = \frac{t_G+1}{2}$ می‌باشد.

قضیه ۸ : اگر n و m ($m < n$) دو عدد طبیعی باشند، آنگاه تعداد زیرگروههای فازی متمایز گروه Z_{p^m} که تکیه‌گاه آنها دقیقاً Z_{p^m} است، برابر با 2^m می‌باشد.

برهان : قرار می‌دهیم

$$U_t(Z_{p^n}) = \{[\mu] \mid \mu \in F(Z_{p^n}), \text{supp } \mu = Z_{p^m}\}$$

$$V_t(Z_{p^m}) = \{[\mu] \mid \mu \in F(Z_{p^m}), \text{supp } \mu = Z_{p^m}\}$$

همانند قضایای قبل Z_{p^n} و Z_{p^m} هر کدام دارای پرچم‌های φ و $\bar{\varphi}$ هستند، که به صورت $\varphi : (\circ) \subset Z_p \subset Z_{p^1} \subset \dots \subset Z_{p^m}$ و $\bar{\varphi} : (\circ) \subset Z_p \subset Z_{p^1} \subset \dots \subset Z_{p^n}$ می‌باشند.

فرض کنید $[\mu] \in U_t(Z_{p^n})$ عضوی دلخواه باشد. بنابراین می‌توان آنرا بصورت

$$\mu = (\underbrace{1 \cdots 1}_{t_0} \underbrace{\alpha_1 \cdots \alpha_1}_{t_1} \cdots \underbrace{\alpha_{r-1} \cdots \alpha_{r-1}}_{t_{r-1}} \underbrace{\circ \cdots \circ}_{t_r})\varphi$$

در نظر گرفت، که در آن $\{1, \alpha_1, \dots, \alpha_{r-1}, \circ\}$ و t_i ‌ها به ازای هر $1 \leq i \leq r$ اعداد طبیعی هستند.

تابع $f : U_t(Z_{p^n}) \rightarrow V_t(Z_{p^m})$ را با ضابطه

$$f([\mu]) = [(\underbrace{1 \cdots 1}_{t_0} \underbrace{\alpha_1 \cdots \alpha_1}_{t_1} \cdots \underbrace{\alpha_{r-1} \cdots \alpha_{r-1}}_{t_{r-1}}) \bar{\varphi}]$$

تعریف می‌کنیم، که تابعی یک‌به‌یک و پوشای است. بنابراین $|U_t(Z_{p^n})| = |V_t(Z_{p^m})|$. درنتیجه تعداد زیر گروههای فازی متمايز Z_{p^n} که تکیه‌گاهشان برابر با Z_{p^n} است برابر با تعداد زیر گروههای فازی متمايز Z_{p^m} با تکیه‌گاه Z_{p^m} می‌باشد، که بنابر قضیه ۶ برابر با 2^m است.

قضیه ۹: اگر n و m ($m < n$) دو عدد طبیعی باشند، احتمال جابجا شدن دو عضو از زیر گروههای فازی متمايز Z_{p^n} که تکیه‌گاه آنها دقیقاً Z_{p^m} است برابر با $\frac{2^m}{2^{n+1}-1}$ می‌باشد.

برهان: چون Z_{p^n} آبلی است، به ازای هر دو زیرگروه فازی Z_{p^n} از μ, ν داریم $\mu \circ \nu = \nu \circ \mu$. قرار می‌دهیم $G = Z_{p^n}, H = Z_{p^m}$. بنابراین $|c_{t_H}| = |F_{t_H}(G)|^2$. اما تعداد زیر گروههای فازی متمايز Z_{p^n} که تکیه‌گاه آنها دقیقاً Z_{p^m} است، برابر با 2^m می‌باشد. لذا $|c_{t_H}| = (2^m)^2$ ، از طرفی اگر $G = Z_{p^n}$ ، بنابر قضیه ۸ برابر با $P(c_{t_H}) = \frac{|c_{t_H}|}{(t_G)^2} = \frac{(2^m)^2}{(2^{n+1}-1)^2} = \left(\frac{2^m}{2^{n+1}-1}\right)^2$ می‌باشد. پس $1 - 2^{n+1} + 2^m$ می‌باشد.

۴ بحث و نتیجه گیری

در سالهای اخیر، شمارش و دسته بندی زیرگروههای فازی بررسی شده است، اما احتمال جابجا شدن زیرگروههای فازی یک گروه مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله احتمال جابجا شدن زیرگروههای فازی متمایز در گروه Z_{p^n} تعیین شده است. گروههای دوری از جمله Z_{p^n} دارای ویژگیهای منحصر به فردی هستند که باعث شده تحقیقات مختلفی روی این گروهها صورت بگیرد. از همین جهت تلفیق دو دیدگاه فازی و احتمالی روی این گروه، باعث پدید آمدن نتایج جالب و زیبایی شد که در متن مقاله به آن اشاره گردید. می‌توان مباحث مورد اشاره در این مقاله را روی گروههای آبلی متناهی بصورت کلی توسعه داد و قضایا و نتایج بدست آمده برای گروه $Z_{p^n q^m}$ نیز تعمیم داد.

تقدیر و تشکر

نویسندهای این مقاله، از داوران محترم که نقطه نظرات آنها در بهبود این مقاله بسیار نقش داشت و از مرکز پژوهشی ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی بابت حمایت مالی تشکر و قدرانی می‌نمایند.

مراجع

ماشینچی، م. زاهدی، م. (۱۳۶۸)، گزارش بیستمین کنفرانس ریاضی کشور دانشگاه تهران، ۲۰۵-۲۵۵.

Gustafson, W. H. (1973), What is the Probabilily that two Groups Elements Commute, *American Mathematistics Monthly*, **80**, 1031-1037.

Mordeson , J. N. and Malik, D. S. (1995), *Fuzzy Commutative Algebra*, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

۱۲۴ مسئله‌ای احتمالاتی در زیر گروه‌های فازی متمايز یک گروه

Murali, V. and Makamba, B. B. (2001), On an Equivalence of Fuzzy Subgroups I, *Fuzzy Sets and Systems*, **123**, 256-264.

Murali, V. and Makamba, B. B. (2004), Counting the Number of Fuzzy Subgroups of an Abelian Group of Order p^nq^m , *Fuzzy Sets and Systems*, **144**, 459-470.

Murali, V. and Makamba, B. B. (2004), Fuzzy Subgroups of Finite Abelian Groups, Far East. *Journal of Mathematical Sciences*, **14**, 113-125.

Nicholson, W.K. (2006), Introduction to Abstract Algebra, *Wiley-InterScience*.

Rosenfeld,R. (1971), Fuzzy Groups,*Journal of Mathematics Anal. Application*, **35**, 512-517.

Sherman, G. J. (1975), What is the Probability? an Automorphism Fixes a Group Element, *American Mathematics Montly*, **82**, 261-264.

Zadeh, L. A. (1965), Fuzzy Sets, *Information and Control*, **8**, 338-353.