

برآورد تابع‌های چگالی احتمال و توزیع تجمعی توزیع بتا وایبول هندسی

شهرام یعقوبزاده شهرستانی

گروه آمار، دانشگاه پیام نور تهران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۹/۲۴ تاریخ آخرین بازنگری: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

چکیده: در این مقاله برآوردهای ماکسیمم درستنمایی، ناریب با کمترین واریانس به طور یکنواخت، صدکی، بهترین برآورد صدکی تک-مشاهدهای در خانواده برآوردهای صدکی تک-مشاهدهای و بهترین برآورد صدکی دو-مشاهدهای در خانواده برآوردهای صدکی دو-مشاهدهای مبتنی بر آمارهای ترتیبی برای تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی توزیع بتا وایبول هندسی، خصوصاً با تابع نرخ خطر گودالی و تکمددی شکل که برای مدل‌بندی داده‌های مربوط به قابلیت اعتماد و طول عمر مفید است در دو بخش به دست آورده شده و با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو و محاسبه میانگین توان دوم خطای برآوردهای مقایسه شده و در هر بخش برآورد مطلوب تعیین می‌شود.

واژه‌های کلیدی: توزیع بتا وایبول هندسی، برآورد صدکی، بهترین برآورد صدکی تک-مشاهدهای، بهترین برآورد صدکی دو-مشاهدهای.

۱ مقدمه

توزیع بتا وایبول هندسی که دارای تابع نرخ خطر با ویژگی افزایشی، کاهشی، گودالی شکل^۱، تکمددی شکل^۲ و افزایشی-کاهشی-افزایشی است توسط کردیرو و همکاران (۲۰۱۳) و بیدرام و همکاران (۲۰۱۳) معرفی و ویژگی‌های آن بر حسب خصوصیات توزیع وایبول هندسی (بارتو-سوزا و همکاران، ۲۰۱۱) بررسی شد. همچنین توزیع بتا وایبول هندسی به عنوان تعمیمی از توزیع وایبول هندسی توسط یعقوبزاده و همکاران

آدرس الکترونیکی نویسنده مسئول مقاله: شهرام یعقوبزاده شهرستانی، yagoubzade@gmail.com
کد موضوع‌بندی ریاضی (۲۰۱۰): 62F105

¹bathhtub

²unimodal

(۲۰۱۵) معرفی و به کمک چند جمله‌ای‌های استرلینگ ویژگی‌های آن بررسی شد. به دلیل انعطاف‌پذیری تابع نرخ خطر این توزیع و کاربرد آن در تحلیل داده‌های قابلیت اعتماد مانند داده‌های مقاومت الایاف شیشه‌های به ضخامت ۱/۵ سانتیمتری (اسمیت و نایلور، ۱۹۸۷)، داده‌های مدت زمان مقاومت قطعه‌های $T_6 - 6061$ آلمینیم در اثر فشار نیروی ۲۶۰۰۰ پوند بر اینچ مربع در هر چرخش و داده‌های مربوط به تعداد خرابی‌های متوالی سیستم‌های تهویه هوایی ناوگان شامل ۱۳ هوایی بائینگ ۷۲۰ (بیدرام و همکاران، ۲۰۱۳) و داده‌های مربوط به اندازه‌گیری سطح لایه ازن در ماههای می-سپتامبر سال ۱۹۷۳ در شهر نیویورک آمریکا (کردیرو و همکاران، ۲۰۱۳)، برآورد توابع‌های چگالی احتمال و توزیع تجمعی توزیع بتا وایبول هندسی تحت شرایطی هدف این مقاله است. برآورد توابع‌های چگالی احتمال و توزیع تجمعی چند توزیع توسط نویسندهای اخیراً مورد توجه قرار گرفته که می‌توان به روش‌های برآورد توابع‌های چگالی احتمال و توزیع تجمعی توزیع پارتولو توسط دیکسیت و جباری نویابی (۲۰۱۰)، توزیع پارتولو-توانی توسط جباری نویابی و جباری نویابی (۲۰۱۰)، توزیع توزیع پواسن-نمایی تعمیم‌یافته توسط باقری و همکاران (۲۰۱۴)، توزیع رایلی تعمیم‌یافته توسط علیزاده و همکاران (۲۰۱۳) و توزیع گامبل-توانی توسط باقری و همکاران (۲۰۱۵) اشاره کرد.

اگر متغیر تصادفی X دارای توزیع بتا وایبول هندسی باشد، آنگاه تابع چگالی احتمال آن به صورت

$$f(x) = \frac{\alpha(1-\theta)^b \beta^\alpha x^{\alpha-1} e^{-b(\beta x)^\alpha} (1-e^{-(\beta x)^\alpha})^{a-1}}{B(a,b)} \times (1-\theta e^{-(\beta x)^\alpha})^{-(a+b)} \quad (1)$$

است، که در آن $0 < \theta < 1, x, \alpha, \beta, a, b >$. در این $B(a,b) = \int_0^1 t^{a-1} (1-t)^{b-1} dt$. در این مقاله فرض می‌شود $a, b = 1$ ، که در این صورت رابطه (۱) به صورت

$$f^*(x) = a\alpha(1-\theta)\beta^\alpha x^{\alpha-1} e^{-(\beta x)^\alpha} \frac{(1-e^{-(\beta x)^\alpha})^{a-1}}{(1-\theta e^{-(\beta x)^\alpha})^{a+1}} \quad (2)$$

و تابع توزیع تجمعی آن به صورت

$$F^*(x) = \left\{ \frac{1-e^{-(\beta x)^\alpha}}{1-\theta e^{-(\beta x)^\alpha}} \right\}^a \quad (3)$$

خواهد شد. در بخش ۲ برای تابع چگالی احتمال (۲) و تابع توزیع تجمعی (۳) به ترتیب برآوردهای ناریب با کمترین واریانس^۳، ماقسیم درستنمایی^۴، صدکی^۵ و بهترین برآورد صدکی تک-مشاهدهای^۶ را در حالتی که پارامتر a نامعلوم و مقادیر α ، β و θ معلومند به دست آورده می‌شوند. در بخش ۳ بهترین برآورد صدکی دو-مشاهدهای^۷، برآوردهای ماقسیم درستنمایی و صدکی برای حالت نامعلوم بودن پارامترهای α و β و معلوم بودن مقادیر a و θ محاسبه می‌شوند. در بخش ۴ به روش شبیه‌سازی مونتکارلو این برآوردهایها با هم ارزیابی و مقایسه می‌شوند. بخش ۵ هم به بحث و نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود.

۲ برآورد پارامترها در حالت معلوم بودن α ، β و θ

یکی از اهداف مقاله معرفی خانواده برآوردهای صدکی تک-مشاهدهای و بهترین برآورد صدکی تک-مشاهدهای برای یک پارامتر است. به همین علت فقط یک پارامتر نامعلوم و بقیه معلوم در نظر گرفته شده‌اند تا بتوان نحوه محاسبه بهترین برآورد صدکی تک-مشاهدهای را بهتر ارائه داد. البته در بخش ۳ خانواده برآوردهای صدکی دو-مشاهدهای و بهترین برآورد صدکی دو-مشاهدهای معرفی شده است.

۲.۱ برآورد ناریب با کمترین واریانس

اگر X_1, \dots, X_n یک نمونه تصادفی از توزیع با تابع چگالی احتمال (۲) باشد، آن‌گاه

$$S = -\sum_{i=1}^n \log\left(\frac{1-e^{-(\beta X_i)^\alpha}}{1-\theta e^{-(\beta X_i)^\alpha}}\right), \quad (4)$$

یک آماره بسنده کامل برای پارامتر a است. بنابر این اگر $(S) = f^{**}(S)$ توزیع X_n بشرط S باشد، آن‌گاه طبق قضیه لهمن-شهفه^۸ $f^{**}(S)$ برآورد ناریب با کمترین واریانس^۹ $f^*(x)$ است. چون داریم

$$E[f^{**}(S)] = \int h(x_n|s)g(s)ds = \int g(x_n, s)ds = f(x_n).$$

³Uniformly Minimum Variance Unbiased (UMVU)

⁴Maximum Likelihood (ML)

⁵Percentile (PC)

⁶Best Single-obsevation Percentile Estimation (BTPE)

⁷Best Two-obsevation Percentile Estimation (BTPE)

که در آن $g(s)$ و (X_n, S) به ترتیب تابع چگالی احتمال S و (X_n, s) هستند.

قضیه ۱: برآورد ناریب با کمترین واریانس $f^*(x)$ به صورت

$$\begin{aligned} \hat{f}(x) &= \frac{(n-1)(1-\theta)a^n\alpha\beta^\alpha x^{\alpha-1}e^{-(\beta x)^\alpha}}{s^{n-1}} \\ &\times \frac{\{s + \log(1 - e^{-(\beta x)^\alpha}) - \log(1 - \theta e^{-(\beta x)^\alpha})\}^{n-2}}{(1 - \theta e^{-(\beta x)^\alpha})^2}, \end{aligned} \quad (5)$$

است، که در آن $\log(1 - \theta e^{-(\beta x)^\alpha}) - \log(1 - \theta e^{-(\beta x)^\alpha}) < s < \infty$

برهان: فرض کنید

$$T = -\sum_{i=1}^{n-1} \log\left(\frac{1 - e^{-(\beta X_i)^\alpha}}{1 - \theta e^{-(\beta X_i)^\alpha}}\right), \quad (6)$$

چون T دارای تابع چگالی به صورت

$$g^*(t) = \frac{a^{n-1}}{\Gamma(n-1)} t^{n-2} e^{-at}, \quad t > 0.$$

و از $U = -\log\left(\frac{1 - e^{-(\beta X_n)^\alpha}}{1 - \theta e^{-(\beta X_n)^\alpha}}\right)$ با تابع چگالی $h(u) = ae^{au}$, $u > 0$ مستقل است، تابع چگالی توام (U, T) به صورت

$$g(u, t) = \frac{a^n}{\Gamma(n-1)} t^{n-2} e^{-a(t+u)}, \quad t > 0, u > 0.$$

می‌شود که به کمک تبدیل‌های $S = T + U$ و $X_n = -\frac{1}{\beta}\{-\log[\frac{1-U}{1-\theta U}]\}^{\frac{1}{\alpha}}$ تابع چگالی توام (X_n, S) به صورت

$$\begin{aligned} g(x_n, s) &= \frac{(1-\theta)a^n\alpha\beta^\alpha x^{\alpha-1}e^{s-(\beta x_n)^\alpha}}{\Gamma(n-1)} \\ &\times \frac{\{s + \log(1 - e^{-(\beta x_n)^\alpha}) - \log(1 - \theta e^{-(\beta x_n)^\alpha})\}^{n-2}}{(1 - \theta e^{-(\beta x_n)^\alpha})^2} \end{aligned}$$

به دست آورده می‌شود. بنابر این رابطه (۵) حاصل می‌شود.

نتیجه ۱: با توجه به رابطه $\hat{F}(x) = \int_k^x \hat{f}(x)dx$ که در آن

$$k = \log(1 - e^{-(\beta x)^\alpha}) - \log(1 - \theta e^{-(\beta x_n)^\alpha})$$

برآورد نااریب با کمترین واریانس $F^*(x)$ برابر است با

$$\hat{F}(x) = [1 - \frac{\log(1 - e^{-(\beta x)^\alpha}) - \log(1 - \theta e^{-(\beta x)^\alpha})}{s}]^{n-1} \quad (4)$$

قضیه ۲: گشتاورهای $\hat{F}(x)$ و $\hat{f}(x)$ به ترتیب عبارتند از

$$\begin{aligned} E[\hat{f}(x)]^r &= \frac{(n-1)^r (1-\theta)^r a^{nr} \alpha^r \beta^{r\alpha} x^{r(\alpha-1)} e^{-r(\beta x)^\alpha}}{\Gamma(n)(1-\theta e^{-(\beta x)^\alpha})^r} \\ &\times \sum_{j=0}^{n-r-1} \binom{(n-1)r}{j} \left\{ \log \left[\frac{1-e^{-(\beta x)^\alpha}}{1-\theta e^{-(\beta x)^\alpha}} \right] \right\}^j \frac{\Gamma(n-r-j)}{a^{n-r-j}} \end{aligned}$$

$$E[\hat{F}(x)]^r = \frac{1}{\Gamma(n)} \sum_{j=0}^{n-1} \binom{(n-1)r}{j} \left\{ -\log \left[\frac{1-e^{-(\beta x)^\alpha}}{1-\theta e^{-(\beta x)^\alpha}} \right] \right\}^j a^j \Gamma(n-j)$$

برهان: به کمک تابع چگالی S و بسط دو جمله ای خیام-نیوتون قضیه ۲ ثابت می‌شود.

نتیجه ۲: با در نظر گرفتن $r = 1, 2$ در قضیه ۲ میانگین توان دوم خطای برای $\hat{F}(x)$ و $\hat{f}(x)$ به ترتیب عبارتند از

$$\begin{aligned} MSE(\hat{f}(x)) &= \frac{(n-1)(1-\theta)^2 a^2 \alpha^2 \beta^2 x^{2\alpha-2} e^{-2(\beta x)^\alpha}}{\Gamma(n)(1-e^{-(\beta x)^\alpha})^4} \\ &\times \{(n-1)a^{n-4} \sum_{j=0}^{n-4} \binom{2n-4}{j} \left\{ -\log \left[\frac{1-e^{-(\beta x)^\alpha}}{1-\theta e^{-(\beta x)^\alpha}} \right] \right\}^j \\ &\times a^j \Gamma(n-j-2) - (n-2)!\} \end{aligned}$$

۳۶۲ برآورد توابع چگالی احتمال و توزیع تجمعی

$$\begin{aligned} MSE(\hat{F}(x)) &= \frac{1}{\Gamma(n)} \sum_{j=0}^{n-1} \binom{2n-2}{j} \left\{ -\log \left[\frac{1-e^{-(\beta x)^\alpha}}{1-\theta e^{-(\beta x)^\alpha}} \right] \right\}^j a^j \Gamma(n-j) \\ &\quad - \left\{ \frac{1-e^{-(\beta x)^\alpha}}{1-\theta e^{-(\beta x)^\alpha}} \right\}^{\alpha} \end{aligned}$$

نتیجه ۳: برآورد ناریب با کمترین واریانس a و میانگین توان دوم خطای آن به ترتیب عبارتند از

$$\begin{aligned} \hat{a} &= \frac{n-1}{-\sum_{i=1}^n [\log(1-\theta e^{-(\beta x_i)^\alpha}) - \log(1-e^{-(\beta x_i)^\alpha})]} \\ MSE(\hat{a}) &= \frac{a^2}{n-2} \end{aligned}$$

۲،۲ برآورد ماکسیمم درستنمایی

فرض کنید X_1, \dots, X_n نمونه‌ای تصادفی از توزیع با تابع چگالی احتمال (۲) باشند. برآورد ماکسیمم درستنمایی a با فرض معلوم بودن α, β و θ عبارت است از

$$\tilde{a} = n \left[- \sum_{i=1}^n \log \left(\frac{1-e^{-(\beta x_i)^\alpha}}{1-\theta e^{-(\beta x_i)^\alpha}} \right) \right]^{-1}$$

که با توجه به تابع چگالی احتمال S , تابع چگالی احتمال $\tilde{a} = w$ برابر است با

$$g(w) = \frac{(na)^n}{\Gamma(n)w^{n+1}} e^{-\frac{na}{w}}, \quad w > 0.$$

همچنین با توجه به خاصیت پایایی برآوردهای ماکسیمم درستنمایی داریم

$$\begin{aligned} \tilde{f}^*(x) &= \tilde{a}\alpha\beta^\alpha(1-\theta)x^{\alpha-1}e^{-(\beta x)^\alpha} \left(\frac{1-e^{-(\beta x)^\alpha}}{1-\theta e^{-(\beta x)^\alpha}} \right)^{\tilde{a}-1} (1-\theta e^{-(\beta x)^\alpha})^{-2} \\ \tilde{F}^*(x) &= \left(\frac{1-e^{-(\beta x)^\alpha}}{1-\theta e^{-(\beta x)^\alpha}} \right)^{\tilde{a}-1} \end{aligned}$$

قضیه ۳: گشتاورهای $\tilde{F}^*(x)$ و $\tilde{f}^*(x)$ به ترتیب عبارتند از

$$E(\tilde{f}^*(x))^r = \frac{(\alpha\beta^\alpha k)^r}{\Gamma(n)} \sum_{j=0}^{n-r-1} \frac{(rt)^j (na)^{j+r} \Gamma(n-r-j)}{j!}$$

$$E(\tilde{F}^*(x))^r = \frac{1}{\Gamma(n)} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(rt)^j (na)^j \Gamma(n-j)}{j!}$$

$t = \log \frac{1-e^{-(\beta x)^\alpha}}{1-\theta e^{-(\beta x)^\alpha}}$ و $k = x^{\alpha-1} e^{-(\beta x)^\alpha} [(\lambda - e^{-(\beta x)^\alpha})(\lambda - \theta e^{-(\beta x)^\alpha})]^{-1}$

برهان: $f^*(x)$ را می‌توان بر حسب w و k به صورت $\tilde{f}^*(x) = \alpha\beta^\alpha k e^{wt}$ نوشت. با توجه به بسط مک‌لورن e^{rwt} و تغییر متغیر $u = \frac{1}{w}$ داریم

$$\begin{aligned} E(\tilde{f}^*(x))^r &= \frac{(\alpha\beta^\alpha k)^r (na)^n}{\Gamma(n)} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(rt)^j}{j!} \int_0^\infty w^{r+j-n-1} e^{-\frac{na}{w}} dw \\ &= \frac{(\alpha\beta^\alpha k)^r}{\Gamma(n)} \sum_{j=0}^{n-r-1} \frac{(rt)^j a^{j+r}}{j!} \Gamma(n-r-j) \\ E(\tilde{F}^*(x))^r &= \frac{(na)^n}{\Gamma(n)} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(rt)^j}{j!} \int_0^\infty w^{j-n-1} e^{-\frac{na}{w}} dw \\ &= \frac{1}{\Gamma(n)} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(rt)^j (na)^j}{j!} \Gamma(n-j) \end{aligned}$$

نتیجه ۴: میانگین توان دوم خطای $\tilde{f}^*(x)$ و $\tilde{F}^*(x)$ به ترتیب عبارتند از

$$\begin{aligned} MSE(\tilde{f}^*(x)) &= \frac{\alpha^\gamma \beta^{\gamma\alpha} k^\gamma}{\Gamma(n)} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(\gamma t)^j (na)^{\gamma+j} \Gamma(n-\gamma-j)}{j!} \\ &- \frac{\gamma a (\alpha\beta^\alpha k)^\gamma e^{at}}{\Gamma(n)} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(\gamma t)^j (na)^{\gamma+j} \Gamma(n-\gamma-j)}{j!} \\ &+ a^\gamma \alpha^\gamma \beta^{\gamma\alpha} k^\gamma e^{\gamma at} \end{aligned}$$

$$MSE(\tilde{F}^*(x)) = \frac{1}{\Gamma(n)} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{[(\gamma t)^j - t^j (\frac{1-e^{-(\beta x)^\alpha}}{1-\theta e^{-(\beta x)^\alpha}})^a] (na)^j}{j!} \Gamma(n-j) + e^{\gamma t}$$

نتیجه ۵: برآورد ماکسیمم درستمایی a برآوردهای اریب برای a و میانگین توان دوم خطای آن برابر است
با

$$MSE(\tilde{a}) = \frac{n+2}{(n-1)(n-2)} a^*$$

۲،۳ برآوردهای صدکی

فرض کنید X_1, \dots, X_n یک نمونه تصادفی از توزیع با تابع توزیع تجمعی (۳) و آماره‌های مرتب این نمونه و p_i صدک مربوط به $X_{(i)}$ باشد. آنگاه $F^*(X_{(i)}) = p_i$ یا

$$a \log\left(\frac{1 - e^{-(\beta X_{(i)})^\alpha}}{1 - \theta e^{-(\beta X_{(i)})^\alpha}}\right) = \log p_i.$$

برآوردهای صدکی a از مینیمم کردن

$$\sum_{i=1}^n [a \log\left(\frac{1 - e^{-(\beta X_{(i)})^\alpha}}{1 - \theta e^{-(\beta X_{(i)})^\alpha}}\right) - \log p_i]^2, \quad p_i = E(X_{(i)}) = \frac{i}{n+1}$$

نسبت به a به صورت

$$\tilde{a}_{PCE} = \frac{\sum_{i=1}^n \log p_i [\log(1 - e^{-(\beta X_{(i)})^\alpha}) - \log(1 - \theta e^{-(\beta X_{(i)})^\alpha})]}{\sum_{i=1}^n [\log(1 - e^{-(\beta X_{(i)})^\alpha}) - \log(1 - \theta e^{-(\beta X_{(i)})^\alpha})]^2}$$

به دست آورده می‌شود. بنابر این برآوردهای صدکی (۲) و (۳) به ترتیب عبارتند از

$$\begin{aligned} \tilde{f}_{PCE}^*(x) &= (\tilde{a}_{PCE}) \alpha \beta^\alpha (1 - \theta) x^{\alpha-1} e^{-(\beta x)^\alpha} \left(\frac{1 - e^{-(\beta x)^\alpha}}{1 - \theta e^{-(\beta x)^\alpha}}\right)^{\tilde{a}_{PCE}-1} \\ &\times (1 - \theta e^{-(\beta x)^\alpha})^{-2} \end{aligned}$$

$$\tilde{F}_{PCE}^*(x) = \left(\frac{1 - e^{-(\beta x)^\alpha}}{1 - \theta e^{-(\beta x)^\alpha}} \right)^{\tilde{a}_{PCE}}$$

برای جزئیات بیشتر در باره روش برآورده صدکی به کائو (۱۹۵۸) و جونسن و همکاران (۱۹۹۴) مراجعه شود. چون محاسبه امید ریاضی و میانگین توان دوم خطای این برآوردها دشوار است با استفاده از شبیه‌سازی، میانگین توان دوم خطای آن‌ها به دست آورده می‌شود.

۲.۴ بهترین برآورده صدکی تک-مشاهده‌ای

روش برآورده صدکی مبتنی بر آماره‌های ترتیبی مانند بهترین برآوردهای صدکی تک-مشاهده‌ای و دو-مشاهده‌ای توسط برخی از نویسندهای برای برآوردهای پارامترهای بعضی از توزیع‌ها استفاده شد که می‌توان به منون (۱۹۶۳)، دوبی (۱۹۶۷، ۱۹۶۵) و زاناکیس (۱۹۸۲) اشاره کرد. فرض کنید X_1, \dots, X_n یک نمونه تصادفی از توزیع با تابع چگالی احتمال (۲) و تابع توزیع تجمعی (۳) با آماره‌های ترتیبی $X_{(k)}$ و $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$ صدک مرتبه p ($0 < p < 1$) توزیع باشد. آن‌گاه

$$p = F^*(X_{(k)}) = \left(\frac{1 - e^{-(\beta X_{(k)})^\alpha}}{1 - \theta e^{-(\beta X_{(k)})^\alpha}} \right)^a.$$

اگر np عدد صحیح باشد ($k = np$) و در غیر این صورت ($k = ([np] + 1)$ ، که در آن $[np]$ بزرگترین عدد صحیح کوچکتر از np است. بنابر این یک برآورده صدکی تک-مشاهده‌ای a به صورت

$$a^* = \frac{\log p}{\log \left(\frac{1 - e^{-(\beta X_{(k)})^\alpha}}{1 - \theta e^{-(\beta X_{(k)})^\alpha}} \right)} = \frac{\log p}{\log Y_{(k)}}$$

به دست آورده می‌شود، که در آن $n, Y_i = \frac{1 - e^{-(\beta X_i)^\alpha}}{1 - \theta e^{-(\beta X_i)^\alpha}}$. با توجه به دوبی (۱۹۶۷)، a^* توزیع نرمال مجانبی با میانگین a و واریانس

$$Var(a^*) = \frac{a^* p^*}{n(1 - p^*) \log^2(1 - p^*) \log^2[-\log(1 - p^*)]}$$

دارد که در آن p^* طوری تعیین می‌شود که $Var(a^*) = 1 - e^{-p}$. اکنون p مینیمم شود. در این صورت به حل معادله

$$\log(1 - p^*) \log[-\log(1 - p^*)] + 2p^* \log[-\log(1 - p^*)] + 2p^* = 0.$$

منجر می‌شود که با روش تکراری $p = 0.1189$ به دست می‌آید. در نتیجه بهترین برآورد صدکی تک-مشاهدهای a به صورت

$$\tilde{a}_{BSPE} = \frac{2/129472}{-[\log(1 - e^{-(\beta X_{(k)})^\alpha}) - \log(1 - \theta e^{-(\beta X_{(k)})^\alpha})]}$$

محاسبه می‌شود، که در آن $k = [0/1189n] + 1$ یا $k = [0/1189n] + 1$. بنابر این بهترین برآوردهای صدکی تک-مشاهدهای (۲) و (۳) به ترتیب عبارتند از

$$\begin{aligned}\tilde{f}_{BSPE}^*(x) &= \tilde{a}_{BSPE} \beta^\alpha (1 - \theta) x_{(k)}^{\alpha-1} e^{-(\beta x_{(k)})^\alpha} \left(\frac{1 - e^{-(\beta x_{(k)})^\alpha}}{1 - \theta e^{-(\beta x_{(k)})^\alpha}} \right)^{\tilde{a}_{BSPE}-1} \\ &\quad \times (1 - \theta e^{-(\beta x_{(k)})^\alpha})^{-2} \\ \tilde{F}_{BSPE}^*(x) &= \left(\frac{1 - e^{-(\beta x_{(k)})^\alpha}}{1 - \theta e^{-(\beta x_{(k)})^\alpha}} \right)^{\tilde{a}_{BSPE}}\end{aligned}$$

۳ برآورد پارامترها در حالت معلوم بودن a و θ

در این بخش بهترین برآورد صدکی دو-مشاهدهای، برآوردهای ماکسیم درستنایی و صدکی برای α, β ، تابع چگالی احتمال (۲) و تابع توزیع تجمعی (۳) به دست آورده می‌شود.

۱ برآورد صدکی دو-مشاهدهای

اگر $X_{(k_i)}$ صدک مرتبه p_i ام توزیع با تابع توزیع تجمعی $F^*(x)$ باشد، آنگاه

$$\alpha(\log \beta + \log X_{(k_i)}) = \log[-\log(\frac{1 - p_i^{\frac{1}{\alpha}}}{1 - \theta p_i^{\frac{1}{\alpha}}})] \quad (8)$$

بنابر این به ازای دو مقدار حقیقی $p_1 < p_2 < 1$ () یک برآورد صدکی دو-مشاهده‌ای α به صورت

$$\begin{aligned}\alpha^* &= \frac{\log[-\log(\frac{1-p_1^a}{1-\theta p_1^a})] - \log[-\log(\frac{1-p_2^a}{1-\theta p_2^a})]}{\log x_{(k_1)} - \log x_{(k_2)}} \\ &= \frac{\log[-\log(1-p_1^*)] - \log[-\log(1-p_2^*)]}{\log x_{(k_1)} - \log x_{(k_2)}} \\ &= \frac{k}{\log x_{(k_1)} - \log x_{(k_2)}}\end{aligned}$$

به دست می‌آید، که در آن $k = \log[-\log(1-p_1^*)] - \log[-\log(1-p_2^*)]$

$$p_1^* = \frac{(1-\theta)p_1^a}{1-\theta p_1^a}, \quad p_2^* = \frac{(1-\theta)p_2^a}{1-\theta p_2^a}. \quad (9)$$

با توجه به دوبی (۱۹۶۷)، α^* توزیع نرمال مجانبی با میانگین α و واریانس

$$\begin{aligned}Var(\alpha^*) &= \frac{\alpha^2}{nk^2} \left[\frac{p_1^*}{(1-p_1^*) \ln(1-p_1^*)} + \frac{p_2^*}{(1-p_2^*) \ln(1-p_2^*)} \right. \\ &\quad \left. - \frac{2p_1^*p_2^*}{(1-p_1^*)(1-p_2^*) \ln(1-p_1^*)(1-p_2^*)} \right]\end{aligned}$$

دارد که با مینیمم کردن $Var(\alpha^*)$ مقادیر $p_1^* = ۰/۹۷۳۷$ و $p_2^* = ۰/۱۶۷۳$ حاصل شده است. بنابر این با توجه به (۹)، p_1 و p_2 به صورت

$$p_i = \left(\frac{p_i^*}{(1-\theta) + \theta p_i^*} \right)^a, \quad i = 1, 2 \quad (10)$$

محاسبه و به ترتیب با نمادهای p_1^{**} و p_2^{**} نشان داده می‌شوند، آنگاه بهترین براورد صدکی دو-مشاهدهای α به صورت

$$\tilde{\alpha}_{BTPE} = \frac{\log[-\log(\frac{1-(p_1^{**})^{\frac{1}{\alpha}}}{1-\theta(p_1^{**})^{\frac{1}{\alpha}}})] - \log[-\log(\frac{1-(p_2^{**})^{\frac{1}{\alpha}}}{1-\theta(p_2^{**})^{\frac{1}{\alpha}}})]}{\log x_{(k_1)} - \log x_{(k_2)}} \quad (11)$$

است، که به ازای $i = 1, 2$ یا $k_i = [np_i^{**}] + 1$ یا $k_i = [np_i^{**}]$ ، $i = 1, 2$ هستند. همچنین یک براورد صدکی دو-مشاهدهای β به کمک روابط (۸) و (۱۱) به صورت

$$\beta^* = \exp(w_1 \log x_{(k_1)} + w_2 \log x_{(k_2)})$$

به دست می‌آید، که در آن $w_1 = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$ و بازیابی $w_1 + w_2 = -1$ ، $w_1 = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$ با توجه به دوبی (۱۹۶۷)، β^* توزیع نرمال مجانبی با میانگین β و واریانس p_i^{**}]

$$Var(\beta^*) = \frac{\beta^2}{n\alpha^2 k^2} \left\{ q_1^* \left(\frac{k - \log k_1}{k_1} \right) \left[\frac{k - \log k_1}{k_1} + \frac{2 \log k_1}{k_2} \right] + \frac{q_2^* \log k_1}{k_2^2} \right\}$$

دارد که در آن $i = 1, 2$ و $p_1^* \cdot p_2^* = \frac{p_i^*}{1-p_i^*}$ ، $k_i = -\log(1-p_i^*)$ ، $i = 1, 2$ از مینیمم کردن $Var(\beta^*)$ توسط دوبی (۱۹۶۷)، به صورت $p_1^* = ۰/۴۲۱۱$ و $p_2^* = ۰/۳۹۷۷$ به دست آورده شده است. بنابر این با توجه به رابطه (۱۰)، p_1 و p_2 محاسبه و به ترتیب با نمادهای p_1^{**} و p_2^{**} نشان داده می‌شوند که در نتیجه بهترین براورد صدکی دو-مشاهدهای β به صورت

$$\begin{aligned} \tilde{\beta}_{BTPE} &= \exp \left\{ \left[\frac{\log[-\log(\frac{1-(p_1^{**})^{\frac{1}{\alpha}}}{1-\theta(p_1^{**})^{\frac{1}{\alpha}}})]}{\log[-\log(\frac{1-(p_2^{**})^{\frac{1}{\alpha}}}{1-\theta(p_2^{**})^{\frac{1}{\alpha}}})]} \right] \log x_{(k_1)} \right. \\ &\quad \left. + \left[\frac{\log[-\log(\frac{1-(p_2^{**})^{\frac{1}{\alpha}}}{1-\theta(p_2^{**})^{\frac{1}{\alpha}}})]}{\log[-\log(\frac{1-(p_1^{**})^{\frac{1}{\alpha}}}{1-\theta(p_1^{**})^{\frac{1}{\alpha}}})]} \right] \log x_{(k_2)} \right\} \end{aligned}$$

به دست آورده می‌شود. بنابر این بهترین برآوردهای صدکی دو-مشاهدهای تابع‌های (۲) و (۳) به ترتیب عبارتند از

$$\begin{aligned}\tilde{f}_{BTPE}^*(x) &= (\tilde{\beta}_{BTPE}^{\tilde{\alpha}_{BTPE}})(1 - \theta)x^{\tilde{\alpha}_{BTPE}-1} \exp(-(\tilde{\beta}_{BTPE}x)^{\tilde{\alpha}_{BTPE}}) \\ &\times \left(\frac{1 - \exp(-(\tilde{\beta}_{BTPE}x)^{\tilde{\alpha}_{BTPE}})}{1 - \theta \exp(-(\tilde{\beta}_{BTPE}x)^{\tilde{\alpha}_{BTPE}})} \right)^{a-1} \\ &\times (1 - \theta \exp(-(\tilde{\beta}_{BTPE}x)^{\tilde{\alpha}_{BTPE}}))^{-1}\end{aligned}$$

$$\tilde{F}_{BTPE}^*(x) = \left(\frac{1 - \exp(-(\tilde{\beta}_{BTPE}x)^{\tilde{\alpha}_{BTPE}})}{1 - \theta \exp(-(\tilde{\beta}_{BTPE}x)^{\tilde{\alpha}_{BTPE}})} \right)^a$$

۳,۲ برآورد ماکسیمم درستنماهی

بر اساس نمونه تصادفی X_1, \dots, X_n از توزیع با تابع چگالی احتمال (۲)، برآورد ماکسیمم درستنماهی پارامترهای α و β با فرض معلوم بودن a و θ به کمک مجموعه معادلات درستنماهی اشاره شده در یعقوبزاده و همکاران (۱۵) با قرار دادن $1 = b$ به دست آورده می‌شوند. چون برآورد پارامترهای α و β به صورت فرم بسته به دست نمی‌آیند به روش عددی روش نیوتون-رافسون محاسبه شده و با جایگذاری در (۲) و (۳) به جای α و β ، برآوردهای ماکسیمم درستنماهی تابع چگالی احتمال (۲) و تابع توزیع تجمعی (۳) به دست آورده می‌شود.

۳,۳ برآوردهای صدکی

فرض کنید X_1, \dots, X_n یک نمونه تصادفی از توزیع با تابع توزیع تجمعی (۳) و با آماره‌های ترتیبی $F^*(X_{(i)}) = p_i$ و p_i صدک مربوط به آنگاه $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$ باشد.

$$\alpha \log(\beta X_{(i)}) = \log\left[-\log\left(\frac{1 - p_i^{\frac{1}{a}}}{1 - \theta p_i^{\frac{1}{a}}}\right)\right]$$

است که برآوردهای صدکی α و β یعنی $\tilde{\alpha}_{PC}$ و $\tilde{\beta}_{PC}$ با مینیمم کردن

$$\sum_{i=1}^n \left\{ \alpha \log(\beta X_{(i)}) - \log[-\log(\frac{1-p^{\frac{1}{a}}}{1-\theta p^{\frac{1}{a}}})] \right\}^2$$

نسبت به α و β به دست می‌آیند که منجر به حل مجموعه معادلات

$$\begin{cases} n\alpha \log \beta + \sum_{i=1}^n \log X_{(i)} - \sum_{i=1}^n \log[-\log(\frac{1-p^{\frac{1}{a}}}{1-\theta p^{\frac{1}{a}}})] = 0 \\ \alpha \sum_{i=1}^n (\log(\beta X_{(i)}))^2 - \sum_{i=1}^n \{\log(\beta X_{(i)}) \log[-\log(\frac{1-p^{\frac{1}{a}}}{1-\theta p^{\frac{1}{a}}})]\} = 0 \end{cases}$$

می‌شود که در آن α و β به روش عددی روش نیوتون-رافسون به دست می‌آیند و مانند روش برآورد ماکسیمم درستنمایی، برآوردهای صدکی (۲) و (۳) به دست آورده می‌شوند.

۴ ارزیابی و مقایسه برآوردها

در این بخش در گام اول با استفاده از

$$X = \frac{1}{\beta} \left\{ -\log \left(\frac{1-U^{\frac{1}{a}}}{1-\theta U^{\frac{1}{a}}} \right) \right\}^{\frac{1}{\alpha}} \quad (12)$$

که در آن متغیر تصادفی U دارای توزیع یکنواخت $(0, 1)$ است و به ازای مقادیر

$$a = 3, 3/5, 4, 5, 6, 7/5, 9$$

$$\alpha = 1/4, 2, 2/5, 3, 5, 6, 8$$

$$\beta = 0/25, 0/75, 3, 4, 6, 7$$

$$\theta = 0/4, 0/5, 0/6, 0/7, 0/8, 0/9$$

نمونه‌های تصادفی به حجم‌های $n = 10, 15, 25, 40, 50$ تولید می‌شود. در گام دوم با توجه به اطلاعات بخش ۲، برآوردهای α و β با توجه به بخش ۳، برآوردهای (α, β) به دست آورده می‌شوند. در گام سوم

میانگین توان‌های دوم خطای برآوردهای تابع‌های (۲) و (۳) در هر دو بخش محاسبه می‌شود. گام‌های اول تا سوم ۱۰۰۰۰ بار تکرار شده و سپس میانگین میانگین‌های توان دوم خطای حاصل از ۱۰۰۰۰ بار تکرار به دست آورده می‌شود. نتایج شبیه‌سازی مربوط به بخش ۲ در جدول ۱ و مربوط به بخش ۳ در جدول‌های ۲ و ۳ و شکل‌های ۱ و ۲ آمده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود برآورد ماکسیم درستنایی تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی از سایر برآوردها بهتر است. همچنین واضح است که با افزایش حجم نمونه، میانگین توان دوم خطای برآوردهای ماکسیم درستنایی کاهش می‌یابد. جدول‌های ۲ و ۳ و شکل‌های ۱ و ۲ نشان می‌دهد که بهترین برآورد صدکی دو-مشاهدهای تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی، از برآوردهای ماکسیم درستنایی و صدکی آن‌ها بهتر است. همچنین براساس یک نمونه تصادفی شبیه‌سازی شده ۵۰ تایی از توزیع با تابع چگالی احتمال (۲) به ازای $\alpha = 1/5$ ، $\beta = 2$ ، $a = 1/2$ و $\theta = 0/6$ به کمک رابطه (۱۲) و با توجه به جدول ۴ که نشان دهنده برآورد پارامترها تحت روش‌های برآورد اشاره شده در بخش ۳ است، برآورد تابع چگالی احتمال (۲) به روش‌های بهترین برآورد صدکی دو-مشاهدهای، برآورد ماکسیم درستنایی و برآورد صدکی در شکل ۳ (سمت راست) رسم شده که نشان دهنده برتری بهترین برآورد صدکی دو-مشاهدهای نسبت به سایر برآوردها است.

بحث و نتیجه‌گیری

در این مقاله برآوردهایی برای تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی توزیع بتا وایبول هندسی تحت شرایطی به دست آورده شد. برآوردهای ماکسیم درستنایی، ناریب با مینیمم واریانس، صدکی و بهترین برآورد صدکی تک-مشاهدهای این تابع‌ها به دست آمده و با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو نشان داده شد برآورد ماکسیم درستنایی از سایر برآوردها بهتر است. برآورد صدکی دو-مشاهدهای، برآورد ماکسیم درستنایی و برآورد صدکی نیز به دست آورده و نشان داده شد که برآورد صدکی دو-مشاهدهای از سایر برآوردها بهتر است. همچنین پیشنهاد می‌شود بهترین برآوردهای صدکی سه مشاهدهای و چند مشاهدهای به کمک آمارهای ترتیبی و روش‌های عددی، محاسبه و با برآوردهای ماکسیم درستنایی، ناریب با کمترین واریانس و صدکی مورد مقایسه قرار گیرد.

جدول ۱. میانگین، میانگین توان دوم خطای برآوردهای ماکسیمم درستمایی، ناریب با مینیمم واریانس، صدکی و بهترین برآورد صدکی تک-مشاهدهای تابع توزیع تجمعی (۲)

\tilde{F}_{BSPE}^*	\tilde{F}_{PCE}^*	\tilde{F}_{UMVUE}^*	\tilde{F}_{MLE}^*	n	$(\alpha, \beta, a, \theta)$
۰/۲۰۷۴	۰/۱۰۵۴	۰/۸۶۲۲	۰/۰۵۴۷	۱۰	
۰/۲۰۳۸	۰/۱۰۳۱	۰/۶۳۱۳	۰/۰۳۵۴	۱۵	
۰/۲۰۱۷	۰/۱۰۵۰	۰/۱۶۷۵	۰/۰۲۱۳	۲۵	(۶, ۷, ۹, ۲, ۰/۹)
۰/۲۰۳۶	۰/۱۰۶۵	۰/۱۲۵۸	۰/۰۱۰۵	۴۰	
۰/۲۰۳۴	۰/۱۰۳۵	۰/۱۸۸۲	۰/۰۰۸۷	۵۰	
۰/۲۰۰۰۰	۳۰/۶۷۰۰	۰/۹۵۴۱	۰/۵۶۵۶	۱۰	
۰/۲۰۰۵	۰/۴۰۶۲	۰/۸۸۲۲	۰/۳۴۹	۱۵	
۰/۱۰۵۹	۰/۴۰۷۹	۰/۳۵۸۷	۰/۱۹۵۲	۲۵	(۳, ۳, ۳, ۰/۸)
۰/۲۰۱۸	۰/۷۰۴۴	۰/۲۱۸۹	۰/۱۲۵۸	۴۰	
۰/۳۰۹۹	۰/۳۰۹۱	۰/۷۲۹۵	۰/۱۰۱۰	۵۰	
۰/۵۸۶۴	۰/۱۰۴۸	۰/۴۹۴۵	۰/۰۹۷۱	۱۰	
۰/۸۶۴۵	۰/۱۰۶۹	۰/۶۷۶۲	۰/۰۸۰۳	۱۵	
۰/۳۹۰۵	۰/۱۰۰۹	۰/۷۹۶۳	۰/۰۴۸۲	۲۵	(۲, ۳, ۴, ۰/۶)
۰/۳۰۱۷	۰/۱۰۶۴	۰/۸۱۳۱	۰/۰۳۰۵	۴۰	
۰/۵۱۶۴	۰/۱۰۶۱	۰/۷۱۴۳	۰/۰۱۵۲	۵۰	
۰/۹۴۴۶	۰/۱۰۰۷	۰/۲۹۰۳	۰/۰۹۲۷	۱۰	
۰/۳۰۹۴	۰/۱۰۷۶	۰/۳۲۹۲	۰/۰۵۹۹	۱۵	
۰/۲۲۱۴	۰/۱۰۳۶	۰/۲۰۷۵	۰/۰۳۲۹	۲۵	(۸, ۶, ۷/۵, ۰/۷)
۰/۲۲۹۴	۰/۱۰۷۷	۰/۸۱۱۷	۰/۰۲۰۹	۴۰	
۰/۱۹۷۰	۰/۱۰۵۲	۰/۲۳۲۹	۰/۰۱۰۵	۵۰	

جدول ۲. میانگین، میانگین توان دوم خطای برآوردهای ماکسیمم درستمایی، ناریب با مینیمم واریانس، صدکی و بهترین برآورد صدکی تک-مشاهدهای تابع توزیع تجمعی (۳)

\tilde{F}_{BSPE}^*	\tilde{F}_{PCE}^*	\tilde{F}_{UMVUE}^*	\tilde{F}_{MLE}^*	n	$(\alpha, \beta, a, \theta)$
۰/۱۲۴۸	۰/۰۸۳۰	۰/۰۹۰۵	۰/۰۰۳۹	۱۰	
۰/۱۱۶۴	۰/۰۸۴۱	۰/۱۱۷۰	۰/۰۰۲۵	۱۵	
۰/۱۱۰۳	۰/۰۸۴۹	۰/۱۹۸۹	۰/۰۰۱۵	۲۵	(۶, ۷, ۹, ۲, ۰/۹)
۰/۱۱۶۲	۰/۰۸۵۲	۰/۴۴۴۱	۰/۰۰۰۹	۴۰	
۰/۱۱۵۹	۰/۰۸۵۵	۰/۳۲۳۴	۰/۰۰۰۶	۵۰	
۰/۲۱۶۸	۰/۰۹۵۲	۰/۸۷۵۰	۰/۰۰۴	۱۰	
۰/۱۷۷۹	۰/۰۹۶۵	۰/۱۸۸۰	۰/۰۰۲۹	۱۵	
۰/۱۷۷۱	۰/۰۹۷۱	۰/۴۳۶۵	۰/۰۰۱۷	۲۵	(۳, ۳, ۳, ۰/۸)
۰/۱۷۸۶	۰/۰۹۷۵	۰/۴۹۸۱	۰/۰۰۱۰	۴۰	
۰/۱۷۷۹	۰/۰۹۶۰	۰/۳۳۵۱	۰/۰۰۰۸	۵۰	
۰/۳۰۱۰	۰/۰۵۹۷	۰/۱۹۰۴	۰/۰۰۴۵	۱۰	
۰/۸۹۲۹	۰/۰۰۸۰	۰/۰۸۰۵	۰/۰۰۲۷	۱۵	
۰/۰۵۰۲	۰/۰۶۲۱	۰/۳۳۱۷	۰/۰۰۱۵	۲۵	(۲, ۳, ۴, ۰/۶)
۰/۵۱۹۷	۰/۰۶۲۹	۰/۱۱۰۷	۰/۰۰۰۹	۴۰	
۰/۴۸۶۴	۰/۰۶۳۲	۰/۸۳۸۹	۰/۰۰۰۷	۵۰	
۰/۰۵۴۶	۰/۰۶۱۳	۰/۴۶۲۶	۰/۰۰۴۰	۱۰	
۰/۲۸۶۷	۰/۰۶۲۴	۰/۹۹۳۸	۰/۰۰۲۵	۱۵	
۰/۲۶۵۱	۰/۰۶۳۷	۰/۱۰۸۷	۰/۰۰۱۴	۲۵	(۸, ۶, ۷/۵, ۰/۷)
۰/۲۷۵۳	۰/۰۶۴۴	۰/۴۰۱۵۴	۰/۰۰۰۹	۴۰	
۰/۲۶۷۹	۰/۰۶۴۶	۰/۳۰۰۴	۰/۰۰۰۷	۵۰	

جدول ۳. میانگین، میانگین توان دوم خطای بهترین برآورد صدکی دو-مشاهده‌ای، برآوردهای ماکسیمم درستنمایی و صدکی تابع توزیع تجمعی (۳)

\tilde{F}_{PCE}^*	\tilde{F}_{UMVUE}^*	\tilde{F}_{MLE}^*	n	$(\alpha, \beta, a, \theta)$
۰/۶۰۹	۰/۵۹۲	۰/۵۱۶	۱۰	
۰/۶۴۲	۰/۵۵۲	۰/۵۷۲	۱۵	
۰/۵۹۸	۰/۵۶۲	۰/۴۱۲	۲۵	(۳, ۴, ۶, ۰/۵)
۰/۴۴۶	۰/۵۲	۰/۳۵۱	۴۰	
۰/۳۹۲	۰/۵۶۸	۰/۳۱۳	۵۰	
۰/۶۵۶	۰/۹۴۳	۰/۳۱۸	۱۰	
۰/۶۰۸	۰/۹۴۳	۰/۲۰۱	۱۵	
۰/۵۴۷	۰/۹۴۴	۰/۱۵۰	۲۵	(۵, ۴, ۳/۵, ۰/۶)
۰/۴۸۹	۰/۹۴۲	۰/۱۳۴	۴۰	
۰/۴۶۲	۰/۹۴۰	۰/۱۳۸	۵۰	
۰/۷۸۱	۰/۳۲۳	۰/۴۹۵	۱۰	
۰/۷۰۴	۰/۳۱۵	۰/۵۱۴۷	۱۵	
۰/۶۴۱	۰/۳۹۱	۰/۳۳۳	۲۵	(۲, ۳, ۵, ۰/۸)
۰/۵۸۴	۰/۷۱۴	۰/۵۲۰	۴۰	
۰/۴۷۶	۰/۵۱۳	۰/۴۱۲	۵۰	
۰/۷۵۱	۰/۷۲۷	۰/۵۳۰	۱۰	
۰/۷۰۰	۰/۷۱۵	۰/۵۲۴	۱۵	
۰/۶۳۲	۰/۵۲۱	۰/۵۱۷	۲۵	(۳, ۳, ۳, ۰/۴)
۰/۵۸۴	۰/۳۷۵	۰/۳۰۰	۴۰	
۰/۴۷۶	۰/۲۱۳	۰/۱۲۷	۵۰	

جدول ۴. برآورد α و β بر اساس یک نمونه تصادفی شبیه‌سازی شده ۵۰ تایی از توزیع (۲)


$\hat{\beta}$	$\hat{\alpha}$	روش برآورد
۲/۵۶۲	۲/۰۴۱	بهترین برآورد صدکی دو-مشاهده‌ای
۲/۶۰۳	۱/۴۰۷	برآورد ماکسیمم درستنمایی
۱/۰۲۵۲	۱/۴۵۲	برآورد صدکی

تقدیر و تشکر


نویسنده مقاله از خدمات سردبیر، داوران محترم مجله و ویراستار برای داوری و تصحیح مقاله تشکر می‌کند.

مراجع


- Alizadeh, M., Bagheri, S. F. and Khaleghy Mogaddam, M. (2013), Efficient Estimation of the Density and Cumulative Distribution Function of the Generalized Rayleigh Distribution, *Journal of Statistical Research of Iran*, **10**, 1-22.
- Bidram, H., Behboodian, J. and Toghedi, M. (2013), The Beta Weibull Geometric Distribution, *Journal of Statistical Computation and Simulation*, **82**, 52-67.
- Bareto-Suza, W., de Morias, A. L. and Cordeiro, G. M. (2011), The Weibull-Geometric Distribution, *Journal of Statistical Computation and Simulation*, **81**, 645-657.
- Bagheri, S. F., Alizadeh, M., Baloui Jamkhaneh, E. and Nadarajah, S. (2014), Evaluation and comparsion of estimations in the generalized Exponential-Poisson, *Journal of Statistical Computation and Simulation*, **84**, 2345-2360.
- Bagheri, S. F., Alizadeh, M. and Nadarajah, S. (2015), Efficient Estimation of PDF and CDF of the Exponentiated Gumbel Distribution, *Communications in Statistics-Simulation and Computation*, **45**, 339-361.
- Cordeiro, G. M., Silva, G. O. and Ortega, E. M. M. (2013), The Beta Weibull Geometric Distribution, *Statistics A Journal of Theoretical and Applied Statistics*, **47**, 817-843.



شکل ۱. نمودارهای میانگین، میانگین توانهای دوم خطای بهترین برآورد صدکی دو-مشاهدهای (خط ممتد)، برآوردهای ماکسیمم درستنمایی (خط چین) و صدکی (نقطه چین) تابع چگالی احتمال (۲) بر اساس مقادیر $\alpha = (3, 4, 6, 0/5)$ ، $\beta = (5, 4, 3, 0/5)$ ، $a = (2, 3, 0/4)$ ، $\theta = (3, 4, 3, 0/4)$ برای (ج) $\gamma = (5, 4, 3, 0/6)$



شکل ۲. نمودارهای میانگین، میانگین توانهای دوم خطای بهترین برآورد صدکی دو-مشاهدهای (خط ممتد)، برآوردهای ماکسیمم درستنمایی (خط چین) و صدکی (نقطه چین) تابع چگالی احتمال (۲)، (سمت راست) و تابع توزیع تجمعی (۳)، (سمت چپ) بر اساس مقادیر α - β - a - θ (۱/۴، ۰/۵، ۳، ۰/۶)، β - a - θ (۱/۴، ۰/۵، ۳، ۰/۸)، γ - a - θ (۲/۵، ۰/۷۵، ۴، ۰/۸) و δ - a - θ (۲/۵، ۰/۷۵، ۴، ۰/۸) برای $(\alpha, \beta, a, \theta)$



شکل ۳. نمودار برآورد تابع چگالی احتمال (۲) بر اساس یک نمونه شبیه‌سازی شده ۵۰ تایی از این توزیع به ازای $\alpha = 1/5$ ، $\beta = 2$ و $a = 1/2$ و $\theta = 6/4$ (الف) و نمودار واقعی تابع چگالی احتمال (۲) (ب).

Dixit, U. J. and Jabbari Nooghabi, M. (2010), Efficient Estimation in the Pareto Distribution, *Statistical Methodology*, **7**, 687-691.

Dubey, S. D. (1965), Asymptotically single observation best estimator of Exponential expected life, *Sankhya, Series A*, **27**, 133-142.

Dubey, S. D. (1967), Some Percentile Estimators for Weibull Parameters, *Tech-nometrics*, **9**, 119-129.

Jabbari Nooghabi, M., Jabbari Nooghabi, H. (2010), Efficient Estimation of PDF and CDF and rth moment for the Exponentiated Pareto Distribution in the presence of outliers, *Statistics A Journal of Theoretical and Applied Statistics*, **44**, 1-20.

Johnson, N. L., Kotz, S. and Balakrishnan, N. (1994), *Continues Univariate Distribution*, Vol. 1, 2nd edition, Wiley, New York.

Kao, J. H. K. (1958), Computer Methods for estimating Weibull Parameters in Reliability studies, *Transaction of IRE-Reliability and Quality Control*, **13**, 15-22.

Menon, M. V. (1963), Estimation of the shape and scale parameters the Weibull Distribution, *Tecnometrics*, **5**, 175-182.

- Smith, R. L. and Naylor, J. C. (1987), A comparison of maximum likelihood and bayesian estimators for the three-parameter Weibull distribution, *Applied Statistics*, **36**, 358-369.
- Yaghoobzadeh, S. S., Shadrokh, A. and Yarmohammadi, M. (2015), Sterling Polynomials and a New Generalization of Weibull- Geometric Distribution, *Journal of Statistical Sciences*, **9**, 119-141.
- Zanakis, S. H. and Mann, N. R. (1982), A Good Simple Percentile Estimator of the Weibull shape Parameter for use when all three parameters are unknown, *Naval Research Logistics*, **29**, 419-428.